

Pesquisa Nacional de Saúde

A saúde do brasileiro em
diferentes fases da vida



PESQUISA

**NACIONAL DE
SAÚDE**

2013

Ciclos de Vida



Histórico

INVESTIGAÇÃO DO TEMA SAÚDE



PNAD



Características da PNS

- Pesquisa Domiciliar
- Abrangência Nacional
- Inserida no Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD)
- Amostra de 80 mil domicílios
- Previsão de realização - Quinquenal



Eixos Principais

- Avaliar o desempenho do sistema nacional de saúde
- Avaliar as condições de saúde da população brasileira
- Garantir a vigilância das doenças crônicas não transmissíveis e os fatores de risco associados



Recorte Regional

- Brasil
- Grandes Regiões
- Unidades da Federação
- Municípios das Capitais e Distrito Federal



Divulgações Anteriores

Volume 1

- Percepção do estado de saúde
- Estilos de vida: consumo alimentar, álcool, atividade física, tabagismo
- Doenças crônicas não transmissíveis

Volume 2

- Acesso e utilização dos serviços de saúde
- Cobertura do Programa Saúde da Família
- Cobertura de planos de saúde
- Saúde bucal
- Atendimento médico
- Acidentes e Violência



Volume 3

- Pessoas com deficiências
- Saúde dos indivíduos com 60 anos ou mais de idade
- Saúde da mulher
- Atendimento pré-natal e Assistência ao parto
- Crianças com menos de 2 anos de idade
- Antropometria e pressão arterial



PESSOAS COM DEFICIÊNCIA




Pessoas com deficiência


Física	Intelectual	Visual	Auditiva
			
<p>Declaração</p>	<p>Declaração</p>	<p>Declaração + Cegueira de ambos os olhos, cegueira de 1 olho e visão reduzida do outro, cegueira de 1 olho e visão normal do outro e baixa visão de ambos os olhos</p>	<p>Declaração + Surdez nos 2 ouvidos, surdez em 1 ouvido e audição reduzida no outro, ou audição reduzida de ambos os ouvidos</p>

6,2%
População total


Proporção de pessoas com deficiência, total, que nasceram, ou a adquiriram por meio de doença ou acidente, na população total, segundo o tipo de deficiência - Brasil - 2013



Proporção de pessoas com grau intenso/muito intenso de limitação, na população com deficiência, segundo o tipo de deficiência - Brasil - 2013



Proporção de pessoas que frequentaram algum serviço de reabilitação, na população com deficiência, segundo o tipo de deficiência – Brasil - 2013



PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS DE IDADE




Pessoas com 60 anos ou mais de idade

13,6%
População total

Aumento da expectativa de vida



Funcionalidade



Atividades
sociais
organizadas



Catarata



Vacina da gripe

Funcionalidade


- Atividades de vida diária




- Atividades instrumentais de vida diária



Proporção de pessoas com limitação funcional para realizar atividades de vida diária, na população de 60 anos ou mais de idade - Brasil - 2013




Proporção de pessoas com limitação funcional para realizar atividades instrumentais de vida diária, na população de 60 anos ou mais de idade – Brasil - 2013




A Regiao Nordeste teve proporcao estatisticamente superior ao n vel nacional, com 22,0%

Proporção de pessoas que participam de atividades sociais organizadas, na população de 60 anos ou mais de idade - Brasil - 2013




Maior na area urbana (25,0%) do que na area rural (19,2%)

Proporção de pessoas diagnosticadas com catarata em uma ou ambas as vistas, na população de 60 anos ou mais de idade - Brasil - 2013




Dentre quem teve diagnostico e teve indicacao medica para cirurgia, 72,2% a realizou

Distribuição percentual das pessoas que não fizeram a cirurgia nos olhos para retirar a catarata, na população de 60 anos ou mais de idade que tiveram indicação para esta cirurgia, segundo o motivo de não ter feito a cirurgia – Brasil – 2013



Proporção de pessoas com 60 anos ou mais de idade que tomaram vacina contra gripe nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa, Brasil e Grandes Regiões - 2013



Motivos para não ter tomado: 25,5% raramente ficam gripados, 25,0% tem medo da reação e 12,1% não acreditam que a vacina protege contra a gripe

SAUDE DA MULHER



Saúde da Mulher

51,9%
População total


Principais usuárias dos serviços de saúde



Contracepção



Gravidez



Exame
preventivo




Cirurgia de
retirada do
útero



Mamografia


Proporção de mulheres que faziam uso de métodos para evitar a gravidez, na população de mulheres de 18 a 49 anos de idade que tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses e ainda menstruam - Brasil - 2013




Principais motivos do não uso: ligação de trompas (46,1%) e porque queriam ou não se importavam em engravidar (16,8%).

Proporção de mulheres de 18 a 49 anos de idade que ainda menstruam, por tipo de método usado para evitar a gravidez - Brasil - 2013

%




Proporção de mulheres que já ficaram grávidas, na população de mulheres de 18 a 49 anos de idade, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo o nível de instrução e a cor ou raça - Brasil – 2013



Idade média de 21 anos, se diferenciando entre os níveis de instrução


Proporção de mulheres que realizaram o exame preventivo para câncer do colo do útero nos últimos três anos anteriores à pesquisa, na população de mulheres de 25 a 64 anos de idade, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as Grandes Regiões – 2013




%

Maiores proporções para mulheres com nível superior completo (88,7%) e brancas (82,6%)

Distribuição percentual das mulheres que nunca fizeram o exame preventivo, na população de mulheres de 25 a 64 anos de idade, segundo os motivos de nunca terem feito o exame - Brasil - 2013




Proporção de mulheres de 50 a 69 anos de idade que realizaram exame de mamografia nos últimos 2 anos anteriores à pesquisa – Brasil - 2013



Menor na Região Norte (38,7%) e maior nas Regiões Sul (64,5%) e Sudeste (67,9%)

Proporção de mulheres que foram submetidas à cirurgia para retirada do útero, na população de mulheres de 18 anos ou mais de idade – Brasil e Grandes Regiões – 2013



Idade média: 43 anos

Principal motivo: 65,7% devido a presença de mioma uterino

Atendimento pre-natal e Assistencia ao parto



Atendimento pré-natal e Assistência ao Parto

Diminui os riscos de complicações e mantém o bem-estar do feto e da mãe

Toda gestante tem direito a assistência ao parto



Orientações recebidas




Local de atendimento



Ultrassonografia




Pessoa responsável pelo parto




Tipos de parto

Proporção de gestantes que realizaram pré-natal, na população de mulheres de 18 a 49 anos de idade, que tiveram o último parto ocorrido no período de 01.01.2012 a 27.07.2013, segundo o período que iniciaram o pré-natal e as orientações médicas – Brasil - 2013




97,7% das mulheres que fizeram pré-natal realizaram pelo menos uma ultrassonografia

Distribuição percentual das gestantes que realizaram pré-natal, segundo o local de atendimento da maioria das consultas de pré-natal – Brasil - 2013




Proporção de gestantes, segundo a pessoa responsável em realizar seu último parto - Brasil - 2013



Enfermeiras são mais comuns na Região Norte (20,5%) e parteiras são mais comuns na Região Nordeste (5,5%)


Proporção de gestantes com parto vaginal, na população de mulheres de 18 a 49 anos de idade, que tiveram o último parto ocorrido no período de 01.01.2012 a 27.07.2013 – Brasil e Grandes Regiões - 2013



SUS (57,6%)

Não SUS (12,0%)


Distribuição dos motivos da gestante ter tido parto cesáreo, na população de mulheres de 18 a 49 anos de idade, que tiveram o último parto ocorrido no período de 01.01.2012 a 27.07.2013 - Brasil - 2013



Indicacao medica: SUS (63,2%) e nao SUS (35,2%)

Quanto a dor e a conveniencia: SUS (4,4%) e nao SUS (20,5%)

Proporção de gestantes com parto cesáreo marcado com antecedência, na população de mulheres de 18 a 49 anos de idade, que tiveram o último parto ocorrido no período de 01.01.2012 a 27.07.2013, segundo a rede de atendimento - Brasil - 2013



Crianças com menos de 2 anos de idade



Crianças com menos de 2 anos de idade

2,4%
População total

Fase importante para o desenvolvimento do indivíduo



Consulta
médica



Testes
Neonatais




Vacinação



Alimentação

Proporção de crianças que receberam a primeira consulta médica no período de até sete dias depois da alta da maternidade, na população com menos de 2 anos de idade, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as Grandes Regiões - 2013


%




Area urbana (30,4%) e area rural (20,0%)

Distribuição percentual das crianças segundo os locais da primeira consulta médica, no período de até sete dias depois da alta da maternidade, na população com menos de 2 anos de idade, com indicação do intervalo de confiança de 95% - Brasil - 2013

%




Proporção de crianças que realizaram testes neonatais, na população com menos de 2 anos de idade, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo o tipo de exame - 2013




Regioes Norte e Nordeste apresentaram proporcao inferiores a media nacional, e as Regioes Sul e Sudeste apresentaram proporcoes superiores.

Proporção de crianças que tomaram pelo menos três doses da vacina tetravalente, na população com 1 ano de idade, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as Grandes Regiões - 2013



Proporção de crianças que tomavam refrigerante ou suco artificial e proporção de crianças que comiam biscoitos, bolachas ou bolo, segundo as Grandes Regiões - 2013



Naõ houve diferenca entre a area rural e urbana

Antropometria e Pressao Arterial



Antropometria e pressão arterial



Índice de
massa corporal

$$\text{IMC} = \frac{\text{Peso}}{(\text{Altura})^2}$$

Excesso de peso $\geq 25 \text{ kg/m}^2$

Obesidade $\geq 30 \text{ kg/m}^2$



Circunferência
da cintura (cc)

Homens $\geq 102 \text{ cm}$

Mulheres $\geq 88 \text{ cm}$




Pressão
Arterial acima
do normal

PA sistólica $\geq 140 \text{ mmHg}$

ou


PA diastólica $\geq 90 \text{ mmHg}$

Prevalência de excesso peso, na população de 18 anos ou mais de idade, por sexo, segundo os grupos de idade - Brasil – 2013




Brasil total (56,9%)

Prevalência de obesidade, na população de 18 anos ou mais de idade, por sexo, segundo os grupos de idade - Brasil – 2013




Brasil total (20,8%)

Prevalência de pessoas com a circunferência da cintura aumentada, na população de 18 anos ou mais de idade, por sexo, segundo os grupos de idade - Brasil – 2013



Brasil total (22,3%)

Prevalência de pessoas com a pressão arterial alta, na população de 18 anos ou mais de idade, por sexo, segundo os grupos de idade - Brasil - 2013



Brasil total (22,3%)

Obrigada!

www.twitter.com/ibgecomunica www.facebook.com/ibgeoficial

www.ibge.gov.br 0800-721-8181

Coordenação de Comunicação Social

Tel: + 55 21 2142 4651

Tel: + 55 21 2142 0941

comunica@ibge.gov.br



Ministério da
Saúde



Ministério do
Planejamento, Orçamento
e Gestão

